

INTERNISTIČNA SLUŽBA
Oddelek za nuklearno medicino in endokrinologijo

DEKSAMETAZONSKI TEST- 1 mg (kratki)

(Navodilo pacientom)

Spoštovani!

Z namenom izključitve prekomernega avtonomnega izločanja kortizola iz skorje nadledvičnih žlez, boste opravili 1 mg deksametazonski test.

OPIS in NAMEN PREISKAVE

Namen preiskave je izključiti prekomerno izločanje kortizola iz skorje nadledvičnih žlez.

PRIPRAVA NA PREISKAVO

Posebna predpriprava na preiskavo ni potrebna. Pomembno je le, da se jo ne izvede v času akutnega prebolevanja okužbe, povišane telesne temperature, prejemanja antibiotične terapije, hudega psihičnega stresa ali fizičnega napora, saj izvid v takem primeru ne bo realen.

POTEK PREISKAVE

Preiskava poteka tako, da dan pred odvzemom krvi ob 23. uri zaužijete 1 mg (2 tbl) deksametazona. Ob 8. uri zjutraj Vam odvezamemo kri na tešče, za določitev ravni kortizola.

DATUM ZAUŽITJA TABLETE: _____

DATUM ODVZEMA KRVI: _____

Za optimalno izvedbo testa je URA zaužitja tablet in odvzema krvi bistvenega pomena!

TVEGANJA POVEZANA S PREISKAVO

Sama preiskava ne predstavlja tveganja za Vaše zdravje. Če imate znano sladkorno bolezen, lahko do dva dni po preiskavi pride do porasta vrednosti krvnega sladkorja.

NAVODILA PO PREISKAVI

Po odvzemu krvi ob 8. uri zjutraj ni potrebno nadaljnje prilagajanje Vaših vsakodnevnih obveznosti in navad.