

NAVODILA ZA BOLNIKE, KI PREJEMAJO CYSTISTAT V SEČNI MEHUR

(Navodila za paciente)

Cystistat izboljša simptome pri večini bolnikov s kroničnim cistitisom in sindromom bolečega mehurja. Zdravilo je izdelano iz hialuronske kisline, ki je del plasti glukozaminoglikana in predstavlja zaščitno plast v sečniku.

1. Par ur pred prejemom instilacije ne uživajte tekočin.
2. Pred instilacijo povejte urologu:
 - če imate vročino, se počutite slabo ali ste zelo utrujeni;
 - če je urin moten ali krvav;
 - če ste imeli po predhodnem zdravljenju težave;
 - če še trajajo težave pri uriniranju.
3. Povejte urologu ali ste imeli po zadnji aplikaciji kakšne težave (temperaturo, pekoče in boleče uriniranje, krvavo vodo...) in koliko časa so težave trajale.
4. Sečni mehur izpraznite tik pred prejemom zdravila.
5. Sterilno vam uvedemo kateter, izpraznimo zaostali urin ter apliciramo Cystistat v sečnik, kateter odstranimo.
6. Cystistat zadržite v mehurju največ 2 uri oz. vsaj 30 minut.
7. Pri otrocih, nosečnicah in doječih materah zdravljenje z zdravilom Cystistat ni priporočljivo.

Od zdravila Cystistat lahko pričakujemo izboljšanje simptomov in kakovosti življenja. Zdravilo se dobro prenaša in so predvidene tedenske aplikacije, v nadaljevanju pa profilaktična uporaba zdravila.