

OHRANITVENE OPERACIJE DOJKE – benigne spremembe (Informacije za pacientke)

Za operacijo se odločamo, kadar v dojki odkrijemo tipno zatrdlino ali netipne spremembe s pomočjo slikovnih preiskav (ultrazvok dojk, mamografija, magnetna resonanca dojk). Z odvzemanjem vzorca spremembe v dojki (biopsijo) s tanko ali debelo iglo ter patološkim pregledom celic ali koščka tkiva že pred operacijo določimo naravo tumorja (benigno, maligno).

BENIGNE (NERAKAVE) SPREMEMBE

V primeru, da v dojki s slikovnimi preiskavami in/ali patološkim pregledom odkrijemo nenevarne benigne spremembe, iz dojke s kirurškim posegom odstranimo le tipen tumor. V splošni ali lokalni anesteziji prerežemo kožo nad tumorjem, tumor ločimo od okolnega normalnega tkiva in ga odstranimo iz dojke. Skrbno zaustavimo krvavitev v ležišču tumorja in zašijemo prerezano kožo dojke.

Praviloma je hospitalizacija po ohranitvenih operacijah kratka in traja navadno do 3 dni. Izvidi histopatoloških preiskav odstranjenega tkiva in odločitev o morebitnem nadaljevanju zdravljenja so znani v do 3 tednih po operaciji. O izvidu je bolnica pisno obveščena.

ZAPLETI PO OHRANITVENIH OPERACIJAH NA DOJKI

- V približno 5% se v rani po operaciji nabira kri in nastane **hematom**. Le redko je potrebna ponovna operacija, pri kateri iz rane odstranimo hematoma in zaustavimo krvavitev. V večini primerov lahko hematoma izpraznimo s punkcijo ali z manjšim razprtjem rane in drenažo hematoma.
- V približno 5% se v področju pooperativne rane na dojki pojavi **vnetje**. Zdravimo ga z antibiotiki, včasih je potrebno manjše razprtje rane in drenaža gnojne vsebine.
- V dojki se po operaciji lahko nabira **serom**. Gre za rumenkasto tekočino, ki se nabira v praznem prostoru, ki nastane po odstranitvi tkiva. Serom odstranjujemo s punkcijo in drenažo, redko je zaradi vztrajanja seroma potrebna ponovna operacija.
- Če je potrebna odstranitev večjega kožnega režnja, lahko pride do odmrtja manjšega ali večjega dela kože. Večinoma se rana po daljšem celjenju spontano zaceli, lahko z večjo **brazgotino**. Včasih je potrebna operacija, ki jo praviloma opravi plastični kirurg.